


**Вареон®** – ефективне та комплексне рішення проти широкого спектру хвороб зернових колосових культур. Вареон® забезпечує профілактичну, лікувальну та викоринювальну дію завдяки поєднанню трьох діючих речовин.

**КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ВАРЕОН®:**

- Ефект імуномодуючої дії – підвищена стійкість рослини до збудників хвороб.
- Тривалий період захисної дії – впродовж 5-6 тижнів.
- Утворює рівномірний захист навколо оброблюваної рослини та захищає необроблені її частини за рахунок парової фази.
- Ефективний проти церкоспорельозної прикореневої гнилі, що спричиняє ламкість стебла.
- Інгібує розвиток широкого спектру патогенів, у тому числі збудників фузаріозу (*Fusarium spp.*).
- Листки нижнього ярусу не відмирають, а залишаються зеленими, що сприяє додатковому збереженню врожайності.

**ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ДІЯ**

Вареон® містить проквіназид, який має здатність активувати значну частину генів культурної рослини, що відповідальні за природну захисну реакцію на вплив патогенів. Стимуляція генів зумовлює захисні реакції культури, що забезпечує стійкість рослин до збудників хвороб та захист нового приросту.



Вінницька область, 2016 рік

**ЗАСТОСУВАННЯ ВАРЕОН®**

Вареон® завдяки вмісту проквіназиду та тебуконазолу забезпечує виражену лікувальну та найтривалішу захисну дію проти борошнистої роси. Прохлораз ефективно зупиняє розвиток церкоспорельозної прикореневої гнилі і снігової плісняви, попереджує розвиток септоріозу, видів іржі та гельмінтоспоріозу, що робить його незамінним для застосування у фазу Т1 (ВВСН 30-32). Водночас використання на ранніх етапах розвитку культури покращує захисні реакції завдяки ефекту імуномодуючої дії.


**Найбільш небезпечні та поширені хвороби:**

**Т0 – початок-середина кущення восени або рано навесні:**

- борошниста роса;
- церкоспорельозна прикоренева гниль;
- снігова пліснява.

**Т1 – кінець кущення, вихід у трубку:**

- борошниста роса;
- септоріоз листя;
- церкоспорельозна прикоренева гниль;
- снігова пліснява.




Борошниста роса



Сітчаста плямистість




Снігова пліснява



Смугаста плямистість




Септоріоз листя



Ринхоспоріоз



Церкоспорельозна прикоренева гниль



Жовта іржа та/або бура іржа

**ВАРЕОН® - ГНУЧКИЙ ФУНГЦИД  
У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ**

1-ша обробка (ВВСН 30-32 – кущення, початок трубкування)	0,7 – 0,8 л/га
2-га обробка (ВВСН 39-49 – прапорцевий листок, до початку колосіння)	0,7 – 0,8 л/га
3-тя обробка по колосу (початок цвітіння (ВВСН 51))	1,0 л/га
Норма витрати робочого розчину	200 – 400 л/га
Максимальна кратність обробок	2 за сезон
Термін очікування	30 днів

**Застосування у посушливих умовах**

Вареон® ефективно працює у регіонах із недостатньою кількістю опадів. За посушливих умов шкодочинність хвороб зменшується, проте вони продовжують ушкоджувати рослину. За таких умов Вареон® – відмінне рішення з тривалим періодом захисної дії.

**Стійкість до опадів**

Вареон® швидко проникає у тканини рослин. Випадання опадів через 2-3 години після обробки не призводить до зниження ефективності препарату.

**Сумісність**

Вареон® сумісний із більшістю засобів захисту рослин, може бути використаний у бакових сумішах із інсектицидами, гербіцидами та мікродобривами. Проте у кожному випадку рекомендується провести тест на сумісність.

Дотримуйтеся рекомендацій щодо послідовності приготування бакових сумішей!



Вигляд пшениці у різних фазах розвитку, яка оброблена Вареон® в Т1 (ВВСН 30-32), Житомирська обл., 2018 р.

**ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ**

Діючі речовини .....прохлораз 320 г/л +  
.....+ тебуконазол 160 г/л + проквіназид 40 г/л  
Препаративна форма .....концентрат емульсії  
Хімічні класи..... імідазоли + триазоли + квіназоліни  
Упаковка.....5 л (4x5 л)  
Норма витрат..... 0,6 – 1,0 л/га

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ**

Культура	Норма витрат, л/га	Спектр дії	Фаза внесення	Кратність обробок
<b>Пшениця озима та яра</b>	0,6 – 1,0	Борошниста роса, церкоспореліозна гниль, снігова пліснява, септоріоз листя, жовта та бура іржа, темно-бура плямистість, піренофороз (жовта плямистість), фузаріоз колосу, септоріоз колосу, альтернاریоз	В період вегетації	2
<b>Ячмінь озимий та ярий</b>	0,6 – 1,0	Борошниста роса, септоріоз листя, жовта іржа, смугаста, сітчаста та темно-бура плямистість, ринхоспоріоз		

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ВАРЕОН®**



**РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ**

Колосовський Вадим	Центрально-Західний регіон	(050) 366 36 60
Корольчук Руслан	Східний регіон	(050) 367 02 13
Голосний Павло	Центрально-Північний регіон	(050) 415 17 64
Федорів Ярослав	Західний регіон	(050) 351 74 09
Нижеголенко Артем	Південний регіон	(099) 902 6281
Войцеховський Іван	Центральний регіон	(050) 387 77 31

**РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ**

Сергійчук Олександр	Житомирська	(095) 284 95 07
Поліщук Ігор	Вінницька	(068) 115 67 21
Дубовий Олександр	Вінницька	(095) 284 95 06
Кондратюк Микола	Хмельницька	(095) 284 95 08
Варварчук Ігор	Одеська	(050) 013 53 52
Мотрук Сергій	Одеська	(096) 228 9 228
Вязовський Віталій	Запорізька	(095) 284 95 13
Кравченко Микола	Миколаївська	(095) 284 95 12
Ференець Володимир	Миколаївська	(067) 801 69 92
Граб Олександр	Херсонська	(050) 469 05 72
Плаксін Віталій	Запорізька	(067) 240 90 67
Бойчук Руслан	Херсонська, спецкультури	(050) 601 29 31
Ткаченко Василь	Сумська	(095) 284 95 02
Дорош Андрій	Чернігівська	(095) 284 95 19
Гусинський Дмитро	Київська	(095) 284 95 10
Ричков Юрій	Донецька/Луганська	(095) 284 95 00
Шапаренко Микола	Харківська	(095) 284 94 98
Козиний Василь	Дніпропетровська	(050) 393 36 52
Чеpecь Валерій	Дніпропетровська	(095) 284 90 09
Бурак Юрій	Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська	(050) 373 23 87
Тарас Серга	Тернопільська	(050) 386 94 06
Ковалець Юрій	Тернопільська	(095) 284 95 21
Мержвінський Максим	Рівненська	(095) 068 63 14
Ільницький Олександр	Львівська, Волинська	(095) 284 92 29
Дрижирук Віктор	Полтавська	(095) 284 95 04
Тараненко Сергій	Кіровоградська	(095) 284 95 16
Поляков Іван	Черкаська	(095) 284 91 19

**ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ**

**Центральний офіс (м. Київ)**

Комнатний Ігор	Керівник відділу по роботі з ключовими клієнтами	(050) 374 53 93
Сайчук Микола	Менеджер по роботі з національними клієнтами (насіння)	(050) 444 11 21
Загородній Андрій	Менеджер з продажу інокулянтів	(095) 283 89 09

**Центрально-Західний регіон**

Богутенко Юрій	Керівник Центрально - Західного регіону	(050) 381 95 73
Левчук Руслан	Закарпатська, Львівська, Волинська, Івано - Франківська, Рівненська, Тернопільська та Житомирська обл.	(050) 386 93 47
Шаталов Олександр	Одеська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська обл.	(050) 440 59 17
Дусанюк Сергій	Вінницька обл.	(050) 355 09 82

**Північно-Східний регіон**

Правило Олег	Керівник Північно-Східного регіону	(050) 314 19 73
Іванов Юрій	Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька та Луганська обл.	(050) 303 07 75
Земський Борис	Чернігівська обл.	(095) 271 92 90
Припула Віталій	Черкаська та Київська обл.	(050) 380 16 08
Рижий Анатолій	Сумська та Полтавська обл.	(095) 284 96 96

Дотримуватися вимог етикетки стосовно доз та термінів застосування.

Перед застосуванням препарату уважно прочитайте тарну етикетку.

Copyright © 2019 Corteva. Всі права захищено.

™ \* Торгові марки Corteva Agriscience, Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer чи їх афілійованих структур або відповідних власників

**Вареон®**

**ФУНГЦИД**

**ФУНДАМЕНТ  
МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ**