



КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ ПО-НОВОМУ

Слаш™

Arylex™ active

ГЕРБІЦИД

Селективний післясходовий гербіцид широкого спектру дії для
весняного застосування у посівах озимого ріпаку

Слаш™

Arylex™ active

ГЕРБИЦИД

ВЕСНЯНИЙ ЗАХИСТ РІПАКУ ОЗИМОГО

Слаш™ селективний післясходовий гербіцид широкого спектру дії для захисту посівів ріпаку озимого у весняний період.

Забезпечує відмінний контроль однорічних та багаторічних широколистих бур'янів.

Має розширене вікно застосування (ВВСН 30-50) та високий рівень безпечності для культури.


Без обмежень у сівозміні.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Діючі речовини:галауксифен-метил, 5 г/л (Арилекс Актив) + клопіралід, 120 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Хімічна група:арилпіколінати + піридин-карбонові кислоти
Упаковка:.....10 л
Норма використання:0,75-1 л/га
Термін зберігання:3 роки

СЛАШ™ – ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Гербіцид призначено для застосування весною після відновлення вегетації озимого ріпаку на початку активного росту бур'янів
- Застосування новітньої молекули Арилекс™ Актив дозволяє відмінно контролювати широкий спектр однорічних та багаторічних широколистих бур'янів, в т.ч. підмареннику чіпкого, волошки синьої, маку польового, лободи білої, видів ромашок, осотів та ін.
- Сумісний із більшістю засобів захисту рослин, що використовуються у посівах ріпаку озимого
- Широке вікно весняного застосування (ВВСН 30-50)
- Рідка, високотехнологічна формуляція (концентрат емульсії), що не потребує використання прилипачів.
- Без обмежень у сівозміні



Новий хімічний клас:
Арилпіколінати

Нова діюча речовина:
Арилекс™ актив

Новий гербіцид:
Слаш™

АРИЛЕКС™ АКТИВ – торгова марка діючої речовини галауксифен-метил.

Винайдена та запатентована компанією ДАУ АГРОСАЄНСЕС.

Галауксифен-метил є першою діючою речовиною, що започаткувала новий клас сполук – **АРИЛПІКОЛІНАТИ**

КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ ПО-НОВОМУ

КОМПОНЕНТИ ПРЕПАРАТУ:

ARYLEX™ ACTIVE

Ариллекс™ Актив

Група О

Арилпіколінати

Ауксиновий механізм дії

Клопіралід

Група О

Піридин-карбонові кислоти

Ауксиновий механізм дії

5 г д.р./л
Галауксифен
метил

Слаш™
гербіцид

120 г д.р./л
Клопіралід

Слаш™ – являє собою високотехнологічну формуляцію двох діючих речовин: галауксифен-метилу та клопіраліду.

Гербіцид швидко поглинається листям і корінням, рухаючись системно по ксилемі і флоемі, накопичується у тканинах меристеми, де трансформується в процесі метаболізму. Внаслідок цього активний ріст чутливих бур'янів припиняється, бур'яни перестають конкурувати з культурою за елементи живлення, воду та сонячне світло.


Діюча речовина галауксифен-метил належить до класу синтетичних ауксинів. Речовина імітує ефект постійної високої дози природного рослинного гормону ауксина, викликаючи супер стимуляцію конкретних ауксин-регульованих генів, що призводить до порушення процесів росту.

Діюча речовина клопіралід – це синтетична форма натурального рослинного гормону. Застосування клопіраліду призводить до заміщення та блокування функцій натуральних гормонів рослини, результатом чого є значні порушення ростових процесів рослини та, як наслідок, її загибель.

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норма витрати	Спектр дії	Фаза внесення	Кратність обробок за сезон
Ріпак озимий	0,75-1 л/га	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів навесні, після відновлення вегетації озимого ріпаку, починаючи від фази початок росту стебла до фази утворення квіткових бутонів у культурі (ВВСН 30-50)	1 за сезон

СХЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ



СПЕКТР КОНТРОЛЬОВАНИХ БУР'ЯНІВ

Застосування гербіциду **Слаш™** забезпечує ефективний контроль в посівах озимого ріпаку широкого спектру однорічних та багаторічних дводольних бур'янів. Окрім того, гербіцид **Слаш™** може суттєво пригнічувати однорічні дводольні бур'яни з родини капустяних: талабан польовий (*Thlaspi arvense* L.), грицики звичайні

(*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus), кучерявець Софії (*Descurainia sophia* (L.) Webb.), якщо на момент обробки рослини цих видів знаходяться на ранніх фазах розвитку. Гербіцид не діє на злакові види бур'янів.

Слаш™ контролює бур'яни, що зійшли на момент обробки та такі, що проростають.

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Чутливість	Бур'яни
Високочутливі 95-100%	Лобода біла <i>Chenopodium album</i> Підмаренник чіпкий <i>Galium aparine</i> Глуха кропива стеблообгортаюча <i>Lamium amplexicaule</i> Волошки сині <i>Centaurea cyanus</i> Глуха кропива пурпурова <i>Lamium purpureum</i>
Чутливі 85-94.9%	Роман польовий <i>Anthemis arvensis</i> Осот польовий <i>Cirsium arvense</i> Рутка лікарська <i>Fumaria officinalis</i> Волосняк розсічений <i>Geranium dissectum</i> Латук дикий <i>Lactuca seriola</i> Ромашка лікарська <i>Matricaria chamomilla</i> Триреберник непахучий <i>Matricaria perforate</i> Мак самосійка (дикий) <i>Papaver rhoeas</i> Жовтозілля звичайне <i>Senecio vulgaris</i>
Середньочутливі 70-84.9%	Кучерявець Софії <i>Descurainia Sophia</i> Молочай сонцеглядний <i>Euphorbia helioscopia</i>

ШВИДКІСТЬ ДІЇ

Активний ріст чутливих бур'янів припиняється через добу після проникнення препарату в рослину. Перші видимі ознаки пригнічення бур'янів проявляються через 1-2 дні після внесення, а остаточна

загибель відбувається через 2-3 тижні після обробки, що залежить від видового складу і стадії розвитку бур'янів, ступеня забур'янення, а також кліматичних умов до, в момент і після обробки.

ТЕХНІЧНІ АТРИБУТИ



Слаш™

Arylex™ active

ГЕРБИЦИД

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Слаш™ сумісний із більшістю засобів захисту рослин, що використовуються у посівах ріпаку озимого. Проте перед застосуванням в кожному окремому випадку необхідно ознайомитись з рекомендаціями препарату-партнера, провести тест на сумісність

та протестувати дію бакової суміші на невеликій ділянці поля. Можливе застосування препарату одночасно з внесенням грамініцидів, регуляторів росту, фунгіцидів чи інсектицидів (окрім фосфорорганічних), рідкими азотними добривами.

НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ СІВОЗМІНИ

Восени того ж року можливо висівати озимі зернові, трави та озимий ріпак. Навесні наступного року можливо висівати ярі зернові, кукурудзу, цукрові буряки, а також ярий

ріпак. У випадку випадання культури, що була оброблена гербіцидом **Слаш™**, можливо пересівати ярими зерновими, травами на насіння, ярим ріпаком чи кукурудзою.

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не рекомендується застосовувати **Слаш™**, якщо посіви ріпаку озимого знаходиться в стані стресу (внаслідок ушкодження рослин шкідниками, хворобами, нестачі живлення, попередньо застосованих препаратів, дії посухи чи спеки, надмірної вологості повітря та ґрунту, а також впливу прохолодних погодних умов, тощо).
- У разі застосування з препаратами-партнерами, слід дотримуватись регламентів їх застосування.
- Слід уникати перекриття та знесення робочого розчину на сусідні культури
- Дощ, що випав протягом 1-ї години після внесення, може знизити ефективність дії препарату.
- Згідно сільськогосподарської практики препарат рекомендується застосовувати коли комахи-запилювачі не є активними (рано вранці або пізно ввечері);
- Забороняється застосування в особистих підсобних господарствах, авіаційним методом, водоохоронній зоні рибогосподарських водойм.

МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ПРЕПАРАТУ

Завдяки тому, що гербіцид **Слаш™** містить в своєму складі дві діючі речовини галауоксифен-метил та клопіралід, ризик виникнення резистентності знижується. Галауоксифен-метил відноситься до нового класу хімічних сполук – арилпіколінати, а клопіралід – до класу піридинів. Обидві діючі речовини за міжнародною класифікацією відносяться до групи О (Group O, HRAC classification), ризик розвитку резистентності у якої, визначений як низький. Однак, щоб унеможливити чи мінімізувати будь-який потенційний ризик, слід дотримуватись наступних рекомендацій:

- Використовувати максимально допустимі дози препарату для контролю важко контрольованих бур'янів
- Забезпечувати ротацію культур в сівозміні
- Здійснювати чергування гербіцидів з іншими механізмами дії на одному полі

Ми рекомендуємо насіння Піонер та Бревант



За консультаціями та з питань придбання звертайтеся до регіональних керівників та представників

РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ

Голосний Павло	Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська	(050)	415-17-64
Лавренчук Геннадій	Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Луганська	(050)	469-05-66
Федорів Ярослав	Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська, Чернівецька	(050)	351-74-09
Корольчук Руслан	Запорізька, Херсонська, Миколаївська	(050)	367-02-13
Кучерявий Андрій	Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська	(095)	284-95-10

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Дубовий Олександр	Вінницька	(095)	284-95-06
Чепець Валерій	Дніпропетровська	(095)	284-90-09
Ричков Юрій	Донецька, Луганська	(095)	284-95-00
Сергійчук Олександр	Житомирська, Рівненська	(095)	284-95-07
Касьянов Анатолій	Київська	(095)	284-95-17
Тараненко Сергій	Кіровоградська	(095)	284-95-16
Ільницький Олександр	Львівська, Волинська	(095)	284-92-29
Кравченко Микола	Миколаївська	(095)	284-95-12
Мотрук Сергій	Одеська	(095)	284-94-99
Дрижирук Віктор	Полтавська	(095)	284-95-04
Ткаченко Василь	Сумська	(095)	284-95-02
Ковалець Юрій	Тернопільська, Івано-Франківська	(095)	284-95-21
Шапаренко Микола	Харківська	(095)	284-94-98
Нижеголенко Артем	Херсонська	(095)	284-95-20
Кондратюк Микола	Хмельницька	(095)	284-95-08
Поляков Іван	Черкаська	(095)	284-91-19
Дорош Андрій	Чернігівська	(095)	284-95-19

Дотримуватися вимог етикетки стосовно доз та термінів застосування
Перед застосуванням препарату уважно прочитайте тарну етикетку